植 物 分 类 学 报 33(5):497～498(1995)
Acta Phytotaxonomica Sinica

国产鼠刺属两新种*

靳淑英
(中国科学院植物研究所，北京 100093)

TWO NEW SPECIES OF *ITEA* FROM CHINA

Jin Shu-ying
(*Institute of Botany, Academia Sinica*, Beijing 100093)

Key words *Itea yangchunensis*; *I. chingiana*

关键词 阳春鼠刺；子农鼠刺

1 阳春鼠刺 新种 图1

Itea yangchunensis Jin. sp. nov.

Species haec habitu *I. coriaceae* Wu similis, sed facile differt a qua foliis minoribus, apice rotundatis vel obtusis; nervis lateralibus et nervullis reticulatis conspicue prominentibus, utrinque distincte glandulosis.

Frutex vel arbuscula. Folia alterna, coriacea, oblonga vel oblongo-elliptica, 5.5～7 cm longa, 1.7～2.5 cm lata, apice rotundata vel obtusa, basi late cuneata, margine praeter basim dense serrulata, plus minusve revoluta in sicco, supra intense viridia, subtus pallide viridia, utrinque glabra, conspicue glandulosa; nervis lateralibus 5-jugatis, arcuate curvatis, nervullis tertiis parallelis vel reticulatis, utrinque conspicue prominentibus.

Guangdong (广东): Yangchun (阳春), Bajia, Jiulongkeng (八甲，九龙坑), ad marginem rivuli, 1935-11-09, Z. Wang (黄志) 38715 (holotypus, IBSC).

本种，外形近似厚叶鼠刺 *I. coriacea* Wu，但叶片较小，顶端圆形或钝，侧脉及网状脉明显凸起，具有极明显的腺体，与后者容易区别。

2 子农鼠刺 新种 图2

Itea chingiana Jin, sp. nov.

Species foliis anguste lanceolatis, apice glanduloso-mucronulatis, margine supra tertiam vel dimidiam partem sparse glanduloso-serratis; inflorescentiis; brevibus robustisque; capsulis striatis a speciebus ceteribus chinensibus generis praecipue differt.

Frutex 5～6 m altus; ramuli teretes, flavo-virides, glabri, conspicue striati. Folia tenuiter coriacea, anguste lanceolata, apice acuminata, glanduloso-mucronulata, basi rotunda-

* 1995-04-19 收稿。

图1 阳春鼠刺 1. 果枝；2. 果实。(张泰利绘)
Fig. 1 *Itea yangchunensis* Jin 1. Fruiting branch; 2. Fruit with persistent sepals and petals.

图2 子农鼠刺 1. 果枝；2. 果实。(张泰利绘)
Fig. 2 *Itea chingiana* Jin 1. Fruiting branch; 2. Fruit with persistent sepals and petals.

ta vel late cuneata, margine supra tertiam vel dimidiam partem sparse glanduloso-serrulata, infra medium integra, saepe revoluta in sicco. Racemae in axillis foliorum superiorum singulares, robustiores, multiflorae; rhachides pedicellique dense puberuli; flores saepe 2～3-fasciculati, rare singulares; pedicelli 2～2.5 mm longi; bracteis subulatis, deciduis. Capsula immatura, brunneo-fulva, 6 mm longa, glabra, striata, persistens.

Gangxi (广西): Luocheng (罗城), alt. 360 m, in frutices, 1928-05-30, R. C. Ching (秦仁昌) 5542A (holotypus, PE)

此特殊的种叶狭披针形，顶端具腺状小尖，边缘1/3或1/2以上有疏腺状锯齿；花序短而粗；蒴果具纵条棱与本属其他种明显不同。